

הורים יקרים

דף מידע זה נועד לתאר את חשיבות בדיקות סיקור שמיעה לילדכם.

לקות בשמיעה היא הלקות התחושתית השכיחה ביותר ביילודים. שכיחותה באוכלוסיית היילודים 1-3 מקרים לכל 1000 לידות, וביילודים שבסיכון גבוה ללקות שמיעה השכיחות גבוהה פי 8 לערך. למחצית מהיילודים הסובלים מלקות בשמיעה אין גורמי סיכון ידועים מראש.

לקות בשמיעה שאינה משוקמת בזמן עלולה לגרום לחסכים משמעותיים בהתפתחות השפתית, השכלית, הרגשית והחברתית של הילד. מחקרים הוכיחו כי גילוי מוקדם של יילודים עם לקות בשמיעה הכרחי לשיקום מוקדם הנחוץ למיזעור נזקי לקות בשמיעה מולדת.

משרד הבריאות ממליץ שכל היילודים יעברו בדיקות סיקור שמיעה בשתי האוזניים לפני השחרור.

הבדיקה נעשית במקום שקט לתינוק שקט או ישן ע"י קלינאי תקשורת מוסמך.

הסיקור יתבצע באמצעות שתי השיטות:

1. Otoacoustic Emissions (OAE) הפלט האקוסטי: המאפשר קבלת מידע על תפקוד תאי השיער החיצוניים שבשבלול האוזן הפנימית כתגובה לצלילים.

2. Auditory Brain stem Response (A-ABR) רישום פוטנציאלים מעוררים מעצב השמע וגזע המוח): רישום אלקטרו פיזיולוגי המאפשר קבלת מידע על תגובות לצלילים מעצב השמע וגזע המוח.

ליילוד ללא גורמי סיכון ללקות שמיעה הסיקור יתבצע בשיטת OAE:

רוב היילודים עוברים את הסיקור מפעם הראשונה.

ליילוד שלא עבר סיקור שמיעה בפעם הראשונה תבוצע בדיקת OAE שניה, בהפרש של מספר שעות. ליילוד עם תגובה לא תקינה בשתי הבדיקות OAE, יבוצע סיקור שמיעה נוסף, בשיטת A-ABR.

לציין: תגובה תקינה לבדיקת A-ABR בנוכחות בדיקת OAE לא תקינה תסוכם כבדיקת סקר שמיעה תקינה.

ליילוד עם גורמי סיכון ללקות בשמיעה תמיד יבוצעו 2 בדיקות סיקור: OAE + A-ABR

- ספור משפחתי דרגה ראשונה של לקות שמיעה קבועה מילדות
 - תסמונת גנטית ביילוד הקשורה בלקות מולדת בשמיעה
 - אשפוז בטיפול נמרץ יילודים למשך יותר מ-5 ימים
 - רמת בילירובין גבוהה המצריכה החלפת דם
- לציין: הסיקור תקין רק כאשר שני סוגים של בדיקות סקר תקינים. כל היילודים עם גורמי הסיכון ללקות שמיעה יופנו למעקב שמיעה במכון אודיולוגי בקופת חולים, גם אם תוצאות בדיקות סיקור השמיעה היו תקינות.

ליילוד עם בדיקת סיקור לא תקינה:

- ישלח שתן ל- CytomegaloVirus (CMV) כדי לשלול זיהום מולד. בדיקה לוקחת מספר ימים, את התוצאה ניתן לברר בטלפון שיצוין במכתב שחרור.
- במכתב שחרור נמליץ לפנות לבירור שמיעה מקיף ואבחון סופי כאן או בקופת חולים: בדיקת BERA דיאגנוסטית, מעקב של רופא א.א.ג. ילדים ומכון אודיולוגי של הקופה.