



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מרפאת גסטרו ילדים



Organization Accredited
by Joint Commission International

מחלת הירשפרונג וביופסיית סקשן רקטלית

עצירות בילדים היא מצב נפוץ מאוד. לרוב האבחנה מבוססת על תסמינים והיסטוריה רפואית ללא המשך בירור. במקרים אחדים, בעיקר כאשר העצירות החלה בגיל מוקדם בחיי התינוק, העצירות יכולה להיות ביטוי למחלה מולדת בשם מחלת הירשפרונג. כאשר הרופא חושד במחלה זו, הילד מוזמן לבדיקה שנקראת ביופסיית סקשן רקטלית.

לפני הבדיקה:

לעיתים יש צורך בהכנה לפני הבדיקה. הרופא ידריך איזה הכנה יש צורך לעשות. בדרך כלל חוקן ניקוי חד פעמי (מיקרולט) יומיים לפני הבדיקה + יום לפני הבדיקה. צום של 4 שעות בבוקר יום הבדיקה.

מהלך הבדיקה:

הבדיקה נעשית דרך פי הטבעת בעזרת מכשיר דק (דמויי אקדח) אשר מוכנס לעומק של כ-4 ס"מ לרקטום. נלקחות בדרך כלל 2 דגימות עמוקות מהרירית של הרקטום אשר נשלחות למעבדה פתולוגית. הבדיקה נמשכת מספר דקות (5-10 דקות) ואינה כואבת. היא נעשית בדרך כלל ללא צורך בהרדמה או טשטוש. מספר דקות לאחר הבדיקה הילד משוחרר לביתו.

לאחר הבדיקה:

- אין תופעות חריגות לאחר הבדיקה. יכול להיות דימום קל דרך פי הטבעת ביום הבדיקה אשר יפסק למחרת. במידה והדימום נמשך יש להיוועץ עם הרופא
- יש לקבוע תור לביקורת וקבלת תשובות הביופסיות במרפאת גסטרו ילדים.

אנו מקוים שדף הדרכה זה ישרת אותך במהלך שהייתך במרפאה ובהחלמתך.
צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.
החלמה מהירה!!