



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מרפאת שד



דף מידע – ביופסיה מנגע בשד

ביופסיה של השד היא נטילת דגימה מגוש חשוד שהתגלה בשד כדי לקבוע אם הוא שפיר או סרטני. הדגימה מבוצעת בדרך כלל באמצעות מחטים מיוחדות. כשהממצא החשוד הוא גוש נמוש בבדיקה ידנית, ניתן לבצע את הדגימה תוך מישוש במרפאה. כאשר הממצא החשוד אינו נמוש ידנית, ניתן לבצע את הדגימה תחת הדמיה. במצב זה, אם ניתן לזהות את הממצא באולטרסאונד, הדגימה תבצע בהכוונת אולטרסאונד. או באמצעות ממוגרפיה.

אמצעי דגימה.

את הביופסיה ניתן לעשות באמצעות מחט דקה או עבה

ביופסיית מחט דקה מתאימה למצבים ייחודיים כמו ציסטה בשד. הדיוק שלה נמוך מזה של ביופסיית מחט עבה. היות שמשתמשים במחט דקה מאוד, ניתן לעשות את הבדיקה ללא הרדמה כלל

ביופסיית מחט עבה מאפשרת לקבל גליל של רקמת שד לצורך בדיקתה. המחט מוחדרת דרך חתך קטן בעור אחרי שהנבדקת מקבלת זריקה להרדמה מקומית.

הכנה לבדיקה

במידה ואת נטלת טיפול תרופתי קבוע ובמיוחד תרופות נוגדות קרישה (מדללי דם) או אספירין- יש להפסיק ליטול את התרופה 5 ימים לפני הבדיקה.

במידה והרופא מבקש-יש להביא תוצאות בדיקות דם עדכניות של תפקודי קרישה, שהתבצעו יום או יומיים לפני הבדיקה.

יש להביא הזמנה מפורטת מהרופא הכוללת: פרטים רפואיים, כולל טיפול תרופתי קבוע, מידע על רגישויות ואלרגיות.

חשוב להביא תוצאות בדיקות קודמות של השד – ממוגרפיה, אולטרסאונד וכן בדיקות אחרות אם יש.

יש להביא טופס התחייבות מקופת חולים עבור הבדיקה.

לאחר הבדיקה אין להרטיב את האזור במשך יממה- רצוי להתקלח לפני ההגעה.

רצוי להגיע עם מלווה

מהלך הבדיקה

הבדיקה מתבצעת בשכיבה על הגב.

במידה ונלקחת ביופסיה בעזרת מחט עבה, נעשית הרדמה מקומית.
נלקחות מספר דגימות רקמה הנשלחות לאחר מכן למעבדה בבית החולים לבדיקה.
לאחר מכן נעשה ניקוי וחיטוי מקום הבדיקה וחבישה קטנה
בסיום הבדיקה יש להמתין כ 30 דקות לביקורת מקום הדגימה.
תשובות תתקבלנה במרפאת השד כ 10 ימים לאחר הבדיקה, יש לקבוע תור למרפאות
השד.

**אנו מקווים שדף הדרכה זה ישרת אותך במהלך שהייתך במרפאה ובהחלמתך.
צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.
החלמה מהירה!!**