

פזילה

היא מצב בו כול עין מביטה לכיוון שונה בצורה שאינה מקבילה . בפזילה ייתכן שעין אחת מביטה קדימה בעוד שהשנייה לצד, כלפי מעלה או מטה. פזילה הוא מצב נפוץ למדי המופיע אצל 1 מכל 20 ילדים רובם בצורה קלה , בילדות פזילה בדרך כלל מתפתחת לפני גיל 5 אולם יכולה להופיע גם מאוחר יותר. פזילות יכולות להיות נרכשות בגיל המבוגר , לעיתים פזילה יכולה לנבוע משיתוק עיזבי או כחלק מסינדרום נרחב יותר.

סיבות:

1. לא ידועה.
2. פזילה מולדת.
3. פזילה נרכשת.

מה זה פזילה מולדת?

פזילה מולדת

מוגדרת כפזילה קבועה שמופיע לפני גיל חצי שנה , כמעט תמיד פזילה מולדת הינה פזילה פנימה , בחלק מהמקרים יש גם סיפור משפחתי של פזילה לאחד ההורים.

פזילה מולדת חולפת היא פזילה החוצה בינקות, היא מופיעה אצל 2-4% מהתינוקות. בשבועות הראשונים לאחר הלידה ייתכנו מצבים שבהם העיניים של התינוק מרצדות לפעמים או שאינן ישרות. המצבים האלה מתרחשים כמה פעמים ביום למשך פרק זמן שנע בין כמה שניות לכמה דקות בכל פעם. עם הגדילה של התינוק והתפתחותו פוחתת התופעה עד שנעלמת בגיל 6 עד 8 שבועות.

פזילה נרכשת?

כל פזילה שמופיעה לאחר גיל 6 חודשים

פזילה סמויה:

פזילה שלא רואים במבט ראשון וגם לא במבט שני. הפזילה הסמויה מופיעה בדרך כלל בילדות ונשארת כל החיים. אין לה בדרך כלל משמעות קלינית, ואין צורך לטפל בה, אלא אם כן היא הופכת לפזילה קבועה.

טיפול בפזילה:

1. משקפיים- חלק מהפזילות ניתן לתקן על ידי משקפיים.
2. תרגילי עיניים- כאשר הפזילה מסוג XT (החוצה) היא גדולה יותר לקרוב, ניתן לטפל בה על ידי תרגילי עיניים לחיזוק יכולת המיקוד.
3. טיפול עם רטיות- בפזילה בלתי קבועה ניתן לנסות לטפל על ידי סגירות לסירוגין של העיניים בעזרת רטיות. **זה טיפול למניעת עין עצלה**
4. ניתוח תיקון פזילה- חלק גדול מן המקרים, הטיפול היעיל לפזילה הינו ניתוח.

