

צילום פלואורסצאין

צילום זה נותן מידע לגבי נזק שנגרם לרשתית, כלי הדם המזינים אותה, ועצב הראייה. צילום זה נעשה באמצעות הזרקת חומר זרחני הנקרא פלואורסצאין, חומר בצבע זוהר לווריד בזרוע ומגיע תוך מספר שניות לעין.

הבדיקה מתבצעת ע"י מצלמה שמזהה את החומר (פלואורסצאין) בעין וכך אפשר להבחין בכלי דם פגועים בעין אשר דורשים המשך טיפול.

לפני הבדיקה:

- תתבקש לחתום על טופס הסכמה מדעת לביצוע הבדיקה.
- תתבקש להגיש בדיקות דם עדכניות, לתפקודי כליות עד חודש ימים מהבדיקה.
- בהגיעך למרפאה תקבל טיפות להרחבת האישונים.
- לאחר מכן תמתין עד שהטיפות משפיעות בנוסף תוכנס ברנולה לוריד.
- יש לידע את הרופא לגבי כל אלרגיה שיש לך לתרופות או ליוז.
- חולים שיש להם רגישות ליוז או לחומר הבדיקה, החולה יקבל הכנה לבדיקה בעזרת סטרואידים ע"י רופא משפחה שלושה ימים טרם הבדיקה. באופן נדיר מאוד אנשים אשר רגישים לאחד ממרכיבי החומר המוזרק יכולים לפתח שוק אנפילקטי וזה מצב מסכן חיים ומחייב אותנו לתת טיפול מידי.

במהלך הבדיקה:

- תתבקש לשבת מול מצלמת הבדיקה ולהשעין את הסנטר והמצח על משענת הבדיקה על מנת להימנע ככל האפשר מתזוזה במהלך הצילום.
- מוזרק חומר זוהר (פלואורסצאין) לווריד ע"י רופא, לאחר מכן הטכנאי יצלם את קרקעית העין.

לאחר הבדיקה:

- עלול עור שלך להיות צהבהב במשך מספר שעות. מאחר והחומר שהוזרק מתפנה דרך הכליות, עלול השתן להיות בעל גוון צהוב חזק עד 6-12 שעות לאחר הבדיקה.
- לאחר הבדיקה הראיה תהיה מטושטשת במשך כ 4-6 שעות בשל הרחבת האישונים.

הנחיות ואזהרות:

- עלולים לחוש בחילה במהלך הבדיקה. תחושה זאת חולפת לרוב לאחר מספר שניות.
- יש להגיע עם מלווה או בתחבורה ציבורית מכיוון שלא תוכל לנהוג לאחר הבדיקה.
- בתוך הבדיקה תקבל דיסק עם הצילומים ותמסור אותו לרופא עיניים שלך.