



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
מרפאה אורתופדית

הזרקה תוך מפרקית

שלום רב,

לאור ממצאי בדיקת הרופא הומלץ שתוזרק לך זריקת דיפרוספן + לידוקאין 1% (DIPROSPAN + LIDOCAIN1%) במינון שנקבע על-ידו ובביצועו.



פעילות התרופות:

דיפרוספן הוא נגזרת של סטרואידים הנמצאים בגוף באופן טבעי וידועים ביכולת הגבוהה שלהם לטיפול בדלקות. לדיפרוספן יש השפעה אנטי דלקתית, אנטי ראומטית, ואנטי אלרגית. הוא משמש לטיפול בבעיות רבות, ביניהן בעיות במערכת השלד והשרירים וברקמות הרכות. התרופה מוזרקת ע"י רופא/ה אורתופד/ית. היא מקלה על כאבים ויכולה לשפר טווח תנועה. הפעילות של התרופה מתחילה לרוב כשלושה ימים עד שבוע לאחר המתן.

לידוקאין הוא חוסם תעלות נטרן בעצבים ובכך מונע הולכה עצבית וגורם לבלוק מקומי, זה אותו החומר המשמש רופא שיניים בזמן טיפול. הפעילות של התרופה היא מיידית.

בדרך כלל, ההשפעה הרצויה מושגת כמעט מייד. לעיתים, לאחר כשעתיים, כאשר חולפת ההשפעה של חומר ההרדמה המקומי, חוזר הכאב לעוד יום או יומיים, אז מורגשת כבר השפעתם של הסטרואידים

השפעת התרופה הינה ארוכת טווח.
לעיתים יש צורך לחזור על ההזרקה כעבור תקופה.

הנחיות למטופל/ת:

1. יש להמתין כרבע שעה לאחר קבלת הזריקה לפני עזיבת המרפאה.
2. סטרואידים יכולים לגרום לעליית ערכי סוכר בדם ולעליית ערכי לחץ-דם, על-כן, באם הנך סובל מיתר לחץ דם או מסוכרת עליך לדאוג למדידת ערכיהם, החל מיום ההזרקה, ובימים הקרובים עד חזרה לערכים הרגילים שלך. יש לדווח לרופא המטפל באם מופיעה חריגה משמעותית מהערכים הרגילים שלך.
3. יש לדווח לרופא באם מופיעה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
4. בשל הסכנה להתפתחות זיהום במקום ההזרקה (נדיר), יש לשים לב להופעתם האפשרית של סימני זיהום מקומיים כגון; חום, אודם, נפיחות או הפרשה, או סימני זיהום כלליים כמו חום גוף גבוה, או צמרמורת.

בכל חשד המתעורר להתפתחותו של סיבוך שכזה, יש לפנות בהקדם אל הרופא המטפל.

אנו מקווים שדף הדרכה זה ישרת אותך במהלך שהייתך במרפאה ובהחלמתך.

צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.

החלמה מהירה!!